



Estrategia &
Investigación Ltda.



Socio
Preferido
Contra el Dolor

SEXTO ESTUDIO NACIONAL DEL DOLOR 2011

Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor
ACED





Propósito

La Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (ACED), presenta los resultados del Sexto Estudio Colombiano sobre el dolor, que en esta oportunidad tuvo énfasis en el dolor agudo.

1. Objetivo principal: Disponer de información relevante, confiable y articulada, sobre el padecimiento del dolor entre la población colombiana urbana, identificando variables de padecimiento de dolor, zona(s) del cuerpo donde se localiza, tratamientos y procedimientos utilizados, y percepción de los productos analgésicos derivados del opio.

2. Objetivos específicos:

- Determinar la prevalencia del dolor en la población bajo estudio
- Conocer la proporción de consultas al médico por dolor y tipo de consulta utilizada
- Conocer la proporción de personas que tomó medicamento y sus formas de presentación
- Profesional o persona que formuló / recomendó el medicamento
- Averiguar el lugar del cuerpo donde se sintió el dolor
- Conocer el procedimiento recomendado para el tratamiento del dolor
- Conocer la percepción del paciente del manejo dado por el médico al dolor
- Percepción de uso, adicción y seguridad de los medicamentos derivados del opio



Metodología

1. Marco muestral

La población objetivo (target) de la investigación la definimos como hombres y mujeres entre 18 y 70 años de edad, residentes en las cuatro principales ciudades del país, en hogares con teléfono.

2. Tamaño de muestra

La muestra se conformó con 600 personas pertenecientes a los diferentes estratos socioeconómicos.

3. Método de recolección

Investigación Cuantitativa por Teléfono: Las entrevistas telefónicas fueron realizadas en un único call center, para facilitar la supervisión, monitoreo y control del trabajo de campo. Los datos fueron capturados directamente por cada entrevistador, mediante un software especializado.

4. Procedimiento utilizado

Para el diseño de muestreo utilizamos el procedimiento de selección aleatoria, estratificado, polietápico, para lo cual se siguieron las siguientes etapas:

Se seleccionaron las principales ciudades colombianas.

Dentro de cada ciudad seleccionada, se escogieron, con base en el procedimiento aleatorio simple, números de teléfonos registrados en el respectivo directorio telefónico.

En cada teléfono se seleccionó una persona mayor de 18 años para hacerle la entrevista.



Tamaño y distribución de la muestra

Región	Muestra	Error *
Bogotá	180	7.3%
Medellín	150	8.00%
Cali	150	8.00%
Barranquilla	120	8.95%
Total	600	4.00%

* Nivel de confianza: 95%



Índice

Parte I. El dolor agudo

- Perfil socio-demográfico
- Prevalencia del dolor
- Proporción de consultas al médico por dolor y tipo de consulta utilizada
- Proporción de personas que tomó medicamento y formas de presentación
- Profesional o persona que formuló / recomendó el medicamento
- Lugar del cuerpo donde se sintió el dolor
- Procedimiento recomendado para el dolor
- Percepción del manejo que el médico da al dolor

Parte II. Medicamentos derivados del opio

- Percepción de uso, adicción y seguridad



Prevalencia de dolor



Base: Universo bajo estudio: 10'727.183 personas



Proporción de personas que consultan al médico por el dolor



Base: Universo bajo estudio: 10'727.183 personas




Proporción de personas que tomó medicamento y forma de presentación utilizada

Si tomó
79,9%




No
20,1%



Base: Universo bajo estudio: 10'727.183 personas




Persona que formuló / recomendó el medicamento



Base: Personas que declaran tomar medicamentos 8'566.862




Lugar del cuerpo donde se localiza el dolor



Base: Universo bajo estudio: 10'727.183 personas



Procedimiento recomendado para el dolor. Dolor postoperatorio



Base: Universo bajo estudio: 10'727.183 personas


Total	N	456.349
¿El Médico le habló de la necesidad de controlar el dolor, antes o después de la cirugía?	Si	80,80%
	No	19,20%

Del total de pacientes que sintieron dolor, el 4,3% le sugirieron cirugía. De estos, al 80%, él médico le habló de la necesidad de controlar el dolor. Para el **28,2%** de los pacientes que fueron sometidos a una cirugía, el tiempo de duración del dolor postoperatorio se percibió entre “*más de lo esperado*” y “*demasiado tiempo*”

Tiempo que le duró el dolor después de la cirugía	1 - Muy poco	40,80%
	3 - Ni mucho ni poco	31,00%
	4 - Más de lo esperado	16,40%
	5 - Demasiado	11,80%



Percepción del manejo que el médico le dio al dolor después de la cirugía



Base: Personas que declararon haber tenido una cirugía: 456349



Estrategia &
Investigación Ltda.



Socio
Preferido
Contra el Dolor

PERCEPCIONES Y OPINIONES SOBRE MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DERIVADOS DEL OPIO


Asociación Colombiana
para el Estudio del Dolor






PERCEPCIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DEL OPIO


Uso de estos medicamentos



¿Creen que causa adicción?



Percepción de seguridad



Base: Universo bajo estudio: 10'727.183 personas

MUCHAS GRACIAS